



Интернет-магазин профессиональной косметики Бьюти Стандарт/BeautyStandart

Тел.: +7 (495) 118-21-33

+7 967 208 84 64

+7 929 586 09 86 – Viber, WhatsApp

Сайт: [www.vipcosmet.ru](http://www.vipcosmet.ru)

E-mail: [2014@vipcosmetolog.ru](mailto:2014@vipcosmetolog.ru)

Салон красоты: г. Москва, Волгоградский пр-т д.6, оф.10

## Block Age Peel Cream (Ретиноевый пилинг)

### Блок Эйдж Пил Крем



Артикул:	МСР341194
Производитель:	Лаборатория Тоскани (Россия)
Бренд:	MedicControlPeel
Тип препарата:	крем-пилинг
Участок применения:	лицо, тело
Возрастная категория:	30+
Тип кожи:	нормальный и сухой
Назначение препарата:	обновление, борьба с морщинами
Тип ухода:	для салонных процедур
Вид упаковки:	диспенсер с дозатором
Объем:	35 мл

Пилинг с 5% ретиноевой кислотой. Предназначен для эстетической коррекции небольших дефектов лица, таких как морщины, пигментные пятна, посттравматические, постоперационные рубцы, рубцы после ранее перенесенной угревой болезни. Входящие в состав средства гликолевая, фитиновая и аскорбиновая кислоты дополняют действие ретиноевой кислоты и обеспечивают максимальный результат и комфортность процедуры.

#### **Показания к применению**

- Увядающая кожа
- Мелкие морщины
- Фотостарение
- Гиперпигментация
- Рубцы постакне

#### **Преимущества**

Комплексное воздействие на кожу препарата и высокая результативность процедуры сочетается с ее атравматичностью и коротким периодом реабилитации.

\* Является изделием медицинского назначения.

#### **ПРОТОКОЛ ПРИМЕНЕНИЯ**

Механизм действия ретиноевых пилингов принципиально отличается от механизма действия других химических пилингов. Ретиноиды не повреждают кожу и не коагулируют протеины. Взаимодействуя с собственными ядерными рецепторами базальных кератиноцитов, меланоцитов и фибробластов, ретиноиды:

- повышают уровень митотической активности базальных кератиноцитов;
- нормализуют процессы дифференцировки и кератинизации в эпидермисе;
- стимулируют синтез эпидермальных липидов;
- активизируют синтез компонентов межклеточного матрикса дермы;
- нормализуют синтез меланина;
- уменьшают количество атипичных клеток.

Вследствие этого замедляется появление возрастных изменений кожи различной этиологии, уменьшается пигментация, улучшается текстура и рельеф кожи. Относясь к пилингам поверхностного воздействия по глубине пенитрации, по полученным результатам, пилинг *BLOCK AGE PEEL CREAM* [линии](#) [MEDICCONTROLPEEL](#) сравним с пилингами срединного воздействия, например, таким как 25% трихлоруксусный. Гистологические исследования показали, что стимулирующее влияние на клеточные структуры кожи сохраняется еще в течение 4 месяцев после последнего нанесения ретиноидов. В рецептуру препарата входит ретиноевая кислота в концентрации 5%, которая обеспечивает высокую результативность *BLOCK AGE PEEL CREAM*. Входящие в состав гликолевая, фитиновая и аскорбиновая кислоты так же дополняют действие ретиноидов и обеспечивают максимальный результат и комфортность процедуры.

## ПОКАЗАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ

1. Увядающая кожа
2. Гиперпигментация

## ПРЕИМУЩЕСТВА

1. Атравматичность
2. Короткий период реабилитации
3. Низкий риск осложнений
4. Высокая безопасность
5. Пилинг можно делать пациентам с тонкой и чувствительной кожей
6. По сравнению с другими видами пилингов данный пилинг наиболее физиологичен
7. Выраженное стимулирующее действие на дерму

## ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

1. Индивидуальная непереносимость
2. Беременность и период лактации
3. Нарушение целостности кожных покровов
4. Активный воспалительный процесс на коже
5. Герпес в активной фазе
6. Печеночная недостаточность и другие тяжелые соматические заболевания
7. Прием ретиноидов

## ПРЕПАРАТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПИЛИНГА

1. [Очищающий препарат Cleansermousse](#)
2. [Альфа-бета комплекс LocaoRico](#)
3. Пилинговый крем *Block age peel cream*

## ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ПРЕДПИЛИНГОВОЙ ПОДГОТОВКИ И ПОСТПИЛИНГОВОГО ПЕРИОДА, ДЛЯ ДОМАШНЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

1. Предпилинговый [крем PrepeelActive](#)
2. Восстанавливающий [крем Vegefarma](#)
3. Постпилинговый [Semtempocream \(Постпилинговый крем\)](#)
4. [Очищающий препарат Cleansermousse](#)

## ПРОТОКОЛ ПРОВЕДЕНИЯ ПИЛИНГА

### *I этап. Предпилингговая подготовка*

**Важно!** Предпилингговая подготовка является обязательной процедурой, так как в противном случае гиперкератоз будет препятствовать пенетрации ретиноидов и значительно снизит эффективность химического пилинга. В течение 14–21 дня перед пилингом пациент должен на ночь наносить на очищенную кожу [крем PrepeelActive](#). Утром необходимо использовать солнцезащитный [крем Mediscreen](#).

### *II этап. Химический пилинг*

**1 шаг.** Очищение. Нанести на кожу лица [Cleansermousse](#), распределить легкими массажными движениями и оставить на 1–2 минуты. Смыть водой. Кожу просушить.

**2 шаг.** Нанести на кожу [Альфа-бета комплекс LocoRico](#) на 10 минут. Смыть водой. Кожу просушить.

**3 шаг.** Равномерно нанести пилинговый крем (приблизительно 5 мл) на кожу всего лица, включая веки и в течение 5–20 минут втирать препарат ватной палочкой. Интенсивность и длительность втирания зависит от типа кожи пациента, а так же от желаемой интенсивности процессов стимуляции.

**4 шаг.** Время экспозиции составляет 4 - 15 часов. Препарат смыть водой и нанести [крем Vegefarma](#).

### *III этап. Постпилингговый уход*

Продолжительность периода реабилитации составляет 4–8 дней. В течение дня, по мере необходимости, наносить [крем Vegefarma](#), утром – солнцезащитный [крем Mediscreen](#).

### **Ожидаемые реакции**

Эритема в области проведения пилинга (аналогичная активному загару в солярии) которая сохраняется в течение 2–4 суток. Возможна незначительная отечность обработанной зоны. Как правило, отеки появляются у пациентов с пастозной, склонной к отекам кожей. Через 12–48 часов после пилинга, в зависимости от степени выраженности гиперкератоза у данного конкретного пациента, наблюдается крупнопластинчатая или мелкопластинчатая эксфолиация (шелушение). На 2–3 сутки после проведения процедуры, пациента может беспокоить зуд, как индивидуальная реакция организма на ретиноиды. В связи с тем, что ретиноиды проникают в сосочковый слой дермы и попадая в кровоток, оказывая системное действие, эксфолиация может наблюдаться даже на тех участках, где пилинг не проводился. Данные явления ожидаемы и не являются симптомами аллергической реакции. Очень важно проинформировать об этом пациента во время консультации.

### **Программы выполнения пилинга**

Базовый курс состоит из 3–5 процедур, которые проводятся с интервалом 6–10 недель. Курс проводится 1 – 2 раза в год.

### **Практические советы**

Предпилингговая подготовка является обязательной, так как в противном случае гиперкератоз будет препятствовать пенетрации ретиноидов и значительно снизит эффективность химического пилинга. Работать следует в перчатках, так как при контакте с препаратом возможна реакция кожи. Пилинг рекомендуется выполнять на этапе подготовки кожи к пластическим операциям. Пациентам с IV и V типами кожи по Фитцпатрику при лечении гиперпигментаций пилинг проводится строго в осенне-зимний период. Не следует использовать абразивы (скрабы, щетки и т.д.), о чем необходимо проинформировать пациента.