



Интернет-магазин профессиональной косметики Бьюти Стандарт/BeautyStandart

Тел.: +7 (495) 118-21-33

+7 967 208 84 64

+7 929 586 09 86 – Viber, WhatsApp

Сайт: [www.vipcosmet.ru](http://www.vipcosmet.ru)

E-mail: [2014@vipcosmetolog.ru](mailto:2014@vipcosmetolog.ru)

Салон красоты: г. Москва, Волгоградский пр-т д.6, оф.10

## Lacticpeel 50% (Молочный пилинг)

### Лактикпил



|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| Артикул:              | МСП341088                    |
| Производитель:        | Лаборатория Тоскани (Россия) |
| Бренд:                | MedicControlPeel             |
| Тип ухода:            | для салонных процедур        |
| Тип препарата:        | раствор                      |
| Участок применения:   | лицо, тело                   |
| Возрастная категория: | любой возраст                |
| Вид упаковки:         | флакон                       |
| Объем:                | 30 мл                        |

Молочная кислота — это альфа-гидроксикислота, обладающая хорошей проникаемостью. Она оказывает кератолитическое действие, способствует уменьшению толщины эпидермиса и разрыхлению рогового слоя. Поверхностный **молочный пилинг** *Lacticpeel* обладает выраженным отбеливающим, отшелушивающим и бактериостатическим действием. Активно увлажняет кожу, стимулируя выработку гликозаминогликанов (включая гиалуроновую кислоту).

#### **ПРЕИМУЩЕСТВА МОЛОЧНОГО ПИЛИНГА LACTISPEEL**

1. Обладает выраженным отбеливающим действием
2. Обладает выраженным увлажняющим действием
3. Относительно безопасен для пациентов со смуглой и темной кожей (низкий риск возникновения постпилинговой гиперпигментации)
4. Хорошо переносится пациентами с чувствительной кожей
5. Оказывает выраженное бактериостатическое и комедонолитическое действие.
6. Препарат может применяться при комедональной форме угревой болезни.

#### **ПОКАЗАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ**

1. Гиперпигментация
2. Гиперкератоз
3. Фотостарение
4. Дисгидратичная и атоничная кожа
5. Себорея
6. Комедональная форма акне I степени

#### **ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ**

1. Индивидуальная непереносимость ингредиентов пилингового состава
2. Нарушение целостности кожных покровов
3. Активный воспалительный процесс на коже
4. Герпес в активной фазе
5. Беременность и период лактации

#### **ПРЕПАРАТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПИЛИНГА**

1. [Очищающий Cleansermousse](#)
2. *Пилинговый лосьон Lacticpeel 50%*
3. [Нейтрализатор Neutralizator](#)
4. Восстанавливающий [крем Vegefarma](#)

#### **ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ПРЕДПИЛИНГОВОЙ ПОДГОТОВКИ И ПОСТПИЛИНГОВОГО ПЕРИОДА ДЛЯ ДОМАШНЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ**

1. Очищающие препараты [Cleanser mousse](#) или [Gentle Cleanser Mousse](#).
2. Предпилинговый крем [PrepeelActive](#)
3. Восстанавливающий [крем Vegefarma](#)
4. Постпилинговый крем [Semtempocream](#)
5. Солнцезащитный крем [Mediscreen SPF 85](#)

## ПРОТОКОЛ ПРОВЕДЕНИЯ ПОВЕРХНОСТНОГО ПИЛИНГА *LACTISPEEL*

### I этап. Предпилингвая подготовка

В течение 14–21 дня на ночь на кожу лица, предварительно очищенную [Cleansermousse](#), пациент должен наносить крем [PrepeelActive](#). Утром необходимо наносить солнцезащитный крем [Mediscreen SPF 85](#).

### II этап. Химический пилинг

**1 шаг.** Очищение. Нанести на кожу очищающий препарат [Cleansermousse](#), распределить легкими массажными движениями и оставить на 15–20 секунд. Смыть водой. Кожу просушить.

**2 шаг.** Препарат наносится [кисточкой](#) или ватными палочками в следующей последовательности: начиная с зоны лба, затем подбородок, щеки, периоральная область, крылья носа и веки. Важно следить за состоянием кожи пациента. При появлении первых признаков эритемы препарат следует нейтрализовать.

**3 шаг.** Не удаляя пилингового состава с кожи, нанести [Нейтрализатор Neutralizator](#) в обратной последовательности, начиная с участков с наибольшей чувствительностью (веки) и заканчивая участками с наименьшей чувствительностью (лоб). Смыть большим количеством воды. Кожу просушить.

**4 шаг.** Нанести на кожу [крем Vegefarma](#) или [ThriphalanBalm](#).

### III этап. Постпилинговый уход

Первые 1–2 дня после процедуры пациент должен использовать увлажняющий [крем Vegefarma](#) (для нормальной и сухой кожи) или [Vegelip](#) (для жирной кожи), утром – солнцезащитный крем [Mediscreen SPF 85](#).

### ОЖИДАЕМЫЕ РЕАКЦИИ ПОСЛЕ ПОВЕРХНОСТНОГО ПИЛИНГА:

- Незначительная эритема, которая может сохраняться от нескольких часов до одних суток;
- Шелушение кожи в течение 2–4 дней после процедуры.

### Программы выполнения пилинга

Базовый курс поверхностного молочного пилинга состоит из 8–12 процедур, которые выполняются с интервалом 7–10 дней. Курс повторять 2 раза в год. Важным этапом процедуры является проведение предпилингвой подготовки, так как в этот период уже идет ингибирующее воздействие на меланогенез, и постпилингвой реабилитации.